Pregătirea pentru
COLONOSCOPIE
și servicii suplimentare

DigestMed
Medicină. Pasiune. Stil de viață.

Cu **3 zile** înainte de investigație se evită alimentele care conțin semințe, sâmburi sau coji (de ex.: fructe, nuci, legume cu semințe, nuci, cereale integrale).

Până cu **3 ore** înainte de administrarea soluției de pregătire, puteți consuma: pește, paste albe, carne slabă, albuș de ou, brânză slabă.

După ce începeți să beți soluția de pregătire, nu mai consumați alimente solide. Cu **7 ore** înainte de procedură, este permisă doar apă plată (nu se consumă alte lichide: lapte, cafea, ceai, alcool, băuturi carbogazoase sau sucuri).
Cu **2 ore** înainte de procedură, trebuie să opriți consumul de apă.

ÎN ZIUA INVESTIGAȚIEI:
Nu fumați, nu mestecați gumă si nu consumati bomboane mentolate.

Cu **7 zile** înainte de procedură se recomandă întreruperea tratamentului pe bază de **bismut** sau **fier** oral.

Dacă aveți incluse în medicația personală anticoagulante precum **Eliquis**, **Xarelto**, **Pradaxa**, se recomandă ca ultima doză să fie administrată cu **12 ore** înainte de procedură.

Dacă utilizați anticoagulante precum **Sintrom**, trebuie să faceți analiza **INR** în săptămâna în care aveți programată procedura. Rezultatul **INR** nu trebuie să depășească valoarea **3**.

Pentru investigațiile efectuate cu sedare, veniți **însoțit(ă)** și **prezentați-vă** la clinică cu **30 de minute** mai devreme. După sedare, nu conduceți timp de **24 de ore**.

Pentru investigațiile efectuate cu sedare, serviciul medical se achită cu **5 zile** lucrătoare înainte de procedură. Restituirea contravalorii serviciului este posibilă numai în cazul anulării programării cu cel puțin **2 zile** lucrătoare înainte de data stabilită.

Pregătire cu EZICLEN

Eziclen este furnizat în 2 flacoane ambalate într-o cutie care conţine şi un pahar pentru diluarea şi administrarea medicamentului.

Pregătirea pentru colonoscopie se face în 2 etape:

Colonoscopie efectuată între orele 08:00 - 16:00:

1. Prima doză

- Primul flacon se administrează seara devreme, până la ora 18:00.
- Se toarnă în pahar conținutul flaconului de Eziclen, apoi se adaugă apă până la marcajul de pe pahar. Soluția obținută se bea încet, în decurs de jumătate de oră, maxim o oră. Apoi, în ora urmatoare, se vor bea obligatoriu încă 2 pahare cu apă sau lichide limpezi.

2. A doua doză

- Al doilea flacon se administrează cu 5 ore înainte de efectuarea procedurii medicale.
- Modalitatea de preparare și de administrare a soluției este aceeași ca la prima doză.

Colonoscopie efectuată după-amiază (după ora 16:00):

1. Prima doză

- Primul flacon se administrează în ziua explorării, dimineață la ora 07:00.
- Se toarnă în pahar conținutul flaconului de Eziclen, apoi se adaugă apă până la marcajul de pe pahar. Soluția obținută se bea încet, în decurs de jumătate de oră, maxim o oră. Apoi, în ora urmatoare, se vor bea obligatoriu încă 2 pahare cu apă sau lichide limpezi.

2. A doua doză

- Al doilea flacon se administrează cu 5 ore înainte de efectuarea procedurii medicale.
- Modalitatea de preparare și de administrare a soluției este aceeași ca la prima doză.

Pregătire cu FORTRANS

Cutia conține 4 plicuri de pulbere.

Indiferent de intervalul orar în care se va efectua colonoscopia, pregătirea se face astfel:

- În ziua anterioară explorării, se dizolvă 2 plicuri Fortrans în 2 litri de apă și se beau între orele 17:00 - 20:00.
- În dimineața procedurii se vor consuma celelalte 2 plicuri dizolvate în 2 litri de apă și se va termina soluția cu 4 ore înainte de investigație.

Pentru a ameliora gustul Fortrans, se poate adăuga zeamă de lămâie sau de portocală.

Se ia medicația curentă cu excepția medicației antidiabetice, dar nu simultan cu Fortransul.

Pregătire cu CLENSIA

Cutia conține 4 plicuri A (mari) și 4 plicuri B (mici), pulbere pentru soluție.
Pentru dizolvarea lor se vor utiliza 2 litri de apă.

Colonoscopie efectuată între orele 08:00 - 16:00:

- Cu o zi înaintea explorării, după ora 19:00, se dizolvă 2 plicuri A și două plicuri B într-un litru de apă și se bea soluția obținută pe parcursul unei ore (250 ml – 2 pahare la fiecare 15 minute). Ulterior în timpul serii se va bea încă 1 litru de lichide: apă, ceai sau alte lichide limpezi, îndulcite sau nu.
- În dimineața următoare, în funcție de ora procedurii, se dizolvă restul de 2 plicuri A și 2 plicuri B într-un litru de apă și se bea soluția timp de o oră. Ulterior se va bea încă 1 litru de lichide: apă, ceai sau alte lichide limpezi, îndulcite sau nu. Pregătirea se termină cu 4 ore înainte de efectuarea colonoscopiei.

Colonoscopie efectuată după-amiază (după ora 16:00):

- Se începe pregătirea în ziua explorării, dimineață la ora 05:00. Se dizolvă 2 plicuri A și 2 plicuri B într-un litru de apă și se bea soluția obținută pe parcursul unei ore (250 ml – 2 pahare la fiecare 15 minute). Ulterior se bea încă 1 litru de lichide: apă, ceai sau alte lichide limpezi, îndulcite sau nu.
- La ora 12:00 se dizolvă restul de 2 plicuri A și 2 plicuri B într-un litru de apă și se bea soluția în același mod, timp de o oră, urmată de 1 litru de lichide limpezi.

Se ia medicația curentă cu excepția medicației antidiabetice, dar nu simultan cu soluția.



Servicii suplimentare Colonoscopie

În cursul efectuării unei colonoscopii se pot realiza manevre sau intervenții suplimentare pentru a îmbunătăți acuratețea diagnosticului sau pentru tratament. Acestea sunt opționale și implică un cost suplimentar. Vă oferim mai jos o listă cu toate aceste servicii, costurile aferente și situațiile în care sunt indicate.

1. Prelevare biopsie – 100 lei

Uneori, în timpul explorării endoscopice, identificăm modificări care pentru diagnosticul precis, monitorizare sau tratament necesită prelevarea unuia sau mai multor fragmente de țesut cu ajutorul unei

pense de biopsie. Fragmentele se plasează ulterior într-un flacon cu formol și se trimit către un laborator de anatomie patologică pentru analiză la microscop. În anumite situații, când sunt necesare biopsii seriate pe un anumit segment, acestea pot fi plasate în ordine pe o bandă Endokit (40 lei) care facilitează examinarea de către medicul anatomopatolog.

2. Pensă de biopsie de unică folosință – 80 lei

Prelevarea fragmentelor de țesut pentru examen histopatologic se poate realiza cu ajutorul unei pense de unică folosință (80 lei).

3. Înregistrare video pe memorie externă – 70 LEI

Puteți solicita înregistrarea imaginilor din timpul investigației endoscopice. Înregistrarea se realizează în timp real, nu dispunem de imagini ulterior. Rezultatul standard al investigației endoscopice vă este oferit sub forma unui raport medical.

4. Examen histopatologic – 400 / 450 / 520 lei

După prelevarea unei biopsii, flaconul cu fragmentele de țesut poate fi trimis către laboratorul de anatomie patologică cu care avem contract, costul examenului histopatologic fiind de 400 / 450 / 520 lei. Aveți și opțiunea de a primi dumneavoastră flaconul pentru a-l duce personal la un laborator de anatomie patologică preferat.

5. Second opinion expert anatomopatologic – 225 lei

Pacienții cu examenul histopatologic inclus în spitalizare de zi pot solicita ca lamele să fie lucrate de către un medic expert.

6. Polipectomie simplă / complexă (peste 2 polipi) – 500 / 800 lei

Dacă pe parcursul colonoscopiei se identifică un polip, acesta poate fi uneori îndepărtat în cursul aceleiași explorări. Acest lucru depinde de aspectul polipului și de existența medicației concomitente care să crească riscul de sângerare.

7. Materiale necesare în cursul polipectomiei sau pentru oprirea unei sângerări:

Ansă polipectomie de unică folosință (150 lei), ansă polipectomie monofilament (170 lei), injectare polipectomie (200 lei), aplicare clip (150 lei), clip pentru hemostază (120 / 450 / 650 lei buc.), coagulare în plasmă de argon (350 lei), coagrasper (700 lei)

8. Tatuare polipi - 450 lei

Atunci când se găsește în cursul colonoscopiei un polip care nu poate fi îndepărtat endoscopic, ci doar chirurgical, marcarea lui cu tuș endoscopic poate orienta chirurgul în cursul intervenției de rezecție.

9. Administrare de perfuzii - 120 lei

Opțional, se pot pune perfuzii cu analgezice și/sau antispastice pentru a reduce disconfortul în cursul investigației colonoscopice.

Vă mulțumim că ne acordați încrederea dumneavoastră apelând la serviciile medicale DigestMed și vă așteptăm cu drag la ora și data programării.

Multă sănătate!
Echipa DigestMed

DigestMed
Medicină. Pasiune. Stil de viață.